



KAMLONG




Magpunla ng buto ng talong (*rootstock*)

5-7 na araw

Magpunla ng buto ng kamatis (*scion*); Ilipat ang punla ng talong sa plastik na paso



15-18 na araw para sa kamatis at 18 na araw sa talong



Idugsong ang kamatis sa talong gamit ang *tube grafting method*


Ilagay sa *humidity chamber* upang maghilom ang dugsong o *union*

4-5 na araw



Ilagay sa *recovery chamber*

2 na araw



Ilagay sa *nursery* sa loob ng 7-10 na araw upang tumibay ang halaman bago itanim

TANDAAN

Ang buong proseso ng pagdudugsong ay inaabot ng **42 araw** bago maitanim sa bukid.
Ang dugsong na halaman ay tumatagal ng **70 araw** sa bukid.

Inihanda nina:

Michelle E. Javier / Agriculturist II
Brian Joseph S. Zulueta / Agriculturist II
Ma. Krizelle Anne M. Manigbas / Project Assistant II
Jeanne Paula T. Sumangil / Information Officer

Iginuhit ni :

Jeanne Paula T. Sumangil / Information Officer

Base sa gawa ni:

Niña R. Rosales / Agriculturist II

Mula sa Proyekto ng pinondohan ng
Department of Agriculture
Bureau of Agricultural Research:

Promotion and Commercialization of Grafting
Technology for Selected Fruit-Vegetables
(Tomato, Sweet Pepper, and Bitter Gourd)

Para sa karagdagang impormasyon,
tumawag o sumulat sa:

THE CENTER CHIEF

BUREAU OF PLANT INDUSTRY
Los Baños National Crop Research,
Development and Production Support Center
4030 Timugan, Los Baños, Laguna



Telefax: (049) 536-0285



(049) 536-0285, 536-0104



bpi_lbnrcrdc@yahoo.com.ph



Bureau of Plant Industry - Los Baños Center



DEPARTMENT OF AGRICULTURE

BUREAU OF PLANT INDUSTRY

Los Baños National Crop Research,
Development and Production Support
Center



PAGDURUGSONG NG KAMLONG

KAMLONG

- Ito ay dugsong na halaman ng kamatis (bilang *scion*) at talong (bilang *rootstock*)
- Ito ay *resistant* laban sa *bacterial wilt*, isa sa mga sakit ng mga *solanaceous crops*, gaya ng kamatis, talong at sili, na nagdudulot ng malaking pinsala sa taniman dahil nakamamatay ito ng halaman
- Ang *bacterial wilt* ay dulot ng *bacterium* na *Ralstonia solanacearum* na natural na naninirahan sa lupa
- Ito ay mas matibay sa ulan at binabahang kondisyon ng lupa
- Mas matagal rin ang buhay nito kumpara sa normal na halaman na kamatis


Mga ginagamit na *varieties*:

Kamatis: Uring gusto ng magtatanim


Talong: EP-RS # 1 (EG-203), EP-RS # 2 (S00019), EP-RS # 3 (S000708)

Pamamaraan ng Pagdurugsong:


1. Putulin ng 30° *angle* ang talong sa ibabaw ng dalawang pinakamababang tumutubong dahon o sa bahaging aakma sa sukat ng *rubber tube*.



2. Putulin ng 30° *angle* ang kamatis sa itaas ng pinakamababang tumutubong dahon o sa bahaging aakma sa sukat ng *rubber tube*.




3. Isuot ang kamatis sa *rubber tube*. Siguraduhing kalahati lamang ng *rubber tube* ang sinasakop ng kamatis.



4. Isuot ang *rubber tube* na may suloy ng kamatis sa putol na bahagi ng talong. Siguraduhing akma ang putol ng kamatis sa putol ng talong. Gawing gabay ang hugis ng *rubber tube*.



5. Siguraduhing nakadugtong ang kamatis sa talong. Obserbahang mabuti kung ang dugtong na halaman ay nakatayo ng tuwid.



TANDAAN

- Ang ginagamit na *rootstock* ay *wild variety* na *open-pollinated* at may taglay na hindi masarap na lasa kumpara sa ibang *varieties*. Ito ay napatunayang *resistant* laban sa *bacterial wilt*.
- Siguraduhing malinis ang mga kamay at mga gamit, gaya ng *blade* at gunting, bago simulan ang pagdurugsong.